




World Health
Organization
Islamic Republic of Iran

نشانه‌ها و علائم تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو





علائم و نشانه‌ها

مدت دوره نهفتگی (زمان بین آلودگی تا بروز علائم)
به روش انتقال ویروس بستگی دارد:

علائم در ۱ تا ۳ روز (حداکثر ۹ روز)
ظاهر می‌شود.

گزش کنه



علائم در ۵ تا ۶ روز (حداکثر ۱۳ روز)
ظاهر می‌شود.

تماس با خون یا
بافت‌های آلوده



شروع علائم، ناگهانی بوده و با موارد زیر همراه است:



سرگیجه



سوزش چشم و
حساسیت به نور



درد و
سفتی گردن



کمردرد



درد عضلانی



تب



World Health
Organization
Islamic Republic of Iran

علائم پیشرفته تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو

بعد از روز پنجم

بعد از ۲ تا ۴ روز



نارسایی کلیه



نارسایی کبد



مشکلات ریوی



افسردگی



خواب‌آلودگی



درد شکم

(بالا سمت راست)



بزرگ شدن
کبد



خستگی

نقاط قرمز
در پوست،
دهان و گلو

۳۰٪ بیماران در هفته دوم ممکن است فوت شوند.

بهبود معمولاً از روز نهم یا دهم شروع می‌شود.



World Health
Organization
Islamic Republic of Iran

تشخیص



تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو

را می توان با انجام

آزمایش های مختلف


تشخیص داد.

تایید تشخیص در شبکه ی آزمایشگاهی

مرجع سلامت، زیر نظر

انستیتو پاستور ایران

انجام می شود.





**World Health
Organization**

Islamic Republic of Iran

**تشخیص زودهنگام
جان افراد را نجات می‌دهد!**